



Le port



La tige



Les feuilles



Les feuilles



L'inflorescence



L'inflorescence



La fleur



Le fruit

Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## Les feuilles

Les feuilles sont alternes, avec une base embrassante.

Face supérieure




Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## Les feuilles

Les feuilles sont composées, formées de 5 à 7 folioles elles-mêmes formées de segments séparés. Elles sont

pétiolées. Les folioles ont un limbe mince. Leurs deux faces sont glabres.



Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## La tige

Elle est creuse, avec une consistance plutôt coriace, à section


ronde. Elle a une surface striée, et elle est glabre.



Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## Inflorescence

Les fleurs sont regroupées en ombelle double à 10 à 20 rayons primaires. Les rayons primaires de l'ombelle sont entourés de folioles simples, courtes, réfléchies. Les rayons secondaires de l'ombelle sont eux-mêmes entourés de folioles simples, courtes.



Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## Port

Plante bisannuelle, de 80 à 100 cm de haut. La tige est dressée, ramifiée.



Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## Inflorescence

Détail de la base des rameaux de l'ombelle



Plante de la famille des Apiaceae.

## Fructification


Les fruits sont des diakènes, caractéristiques des Umbellifères, et formés par la soudure des deux carpelles. Ils sont globuleux. Ils ont une surface striée, et sont glabres, avec 5 côtes crénelées. Ils sont pourvus d'un bec court, arqué.



Plante de la famille des Apiaceae. Elle fleurit de juin à août.

## Fleur

Les fleurs sont blanches. Elles présentent 5 étamines libres. Le pistil est surmonté de 2 styles. La corolle est formée de 5 pétales, égaux dans les fleurs centrales de l'ombelle mais légèrement plus grands sur l'extérieur dans les fleurs périphériques. Ces pétales sont libres, avec l'extrémité échancrée légèrement. La fleur est dépourvue de sépales.





Le port



La tige



Les feuilles




Les feuilles




L'inflorescence




L'inflorescence



La fleur



Le fruit



Plante de la famille des Apiaceae.

### Les feuilles


Les feuilles sont composées, formées de 3 folioles elles-mêmes formées de segments séparés. Elles ont un limbe mince. Leurs deux faces sont pubescentes



Plante de la famille des Apiaceae.

### Fructification

Les fruits sont des diakènes, caractéristiques des Umbellifères, et formés par la soudure des deux carpelles. Ils sont allongés, cylindriques. Ils ont une surface lisse, et sont glabres. Ils sont pourvus d'un bec court, arqué.



Plante de la famille des Apiaceae.

### Les feuilles


Les feuilles sont alternes, avec une base engainante.



Plante de la famille des Apiaceae.

### Fleur

La corolle est formée de 5 pétales, égaux dans les fleurs centrales de l'ombelle mais légèrement plus grands sur l'extérieur dans les fleurs périphériques. Ces pétales sont libres, avec l'extrémité arrondie. La fleur est dépourvue de sépales.



Plante de la famille des Apiaceae.

### La tige

La tige est creuse, avec une consistance plutôt coriace, à section anguleuse. Elle a une surface cannelée, et elle est poilue.



Plante de la famille des Apiaceae.

### Fleur

Les fleurs sont blanches. Elles sont portées par un pédoncule long et glabre. Elles présentent 5 étamines libres. Le pistil est surmonté de 2 styles dressés.



Plante de la famille des Apiaceae, aussi appelée Ciguë blanche. Elle fleurit de mai à juillet.

### Port

Plante vivace, de 60 à 100 cm de haut. La tige est dressée, ramifiée, à nœuds légèrement renflés.



Plante de la famille des Apiaceae.

### Inflorescence

Les fleurs sont regroupées en ombelle double à 7 à 16 rayons primaires portant chacun 8 à 12 rayons secondaires. Il n'y a pas de foliole au niveau des rameaux primaires. Les rayons secondaires de l'ombelle sont eux-mêmes entourés de folioles simples allongées et pointues, couvertes de poils longs et réfléchies à maturité.

