

Canigen[®] MHAPPi/LR

2

No. de Reg. B-0042-021
USO VETERINARIO



Vacuna viva contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus Canino, Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina, antígenos inactivados contra la Leptospirosis canina y Rabia canina.

: Vacuna viva atenuada para la Inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus Canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina.

Antígenos inactivados para la inmunización activa contra Leptospirosis canina y Rabia canina.



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina, Parvovirus canino, Leptospirosis y Rabia canina.

PRESENTACIÓN
Caja con 10 dosis.



FÓRMULA

La fracción liofilizada contiene virus atenuados de:

Virus Distemper canino (cepa Lederle)..... 10^3 - 10^5 DICC₅₀
Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan).... 10^4 - 10^6 DICC₅₀
Parvovirus canino (cepa CPV 780916)..... 10^5 - 10^7 DICC₅₀
Parainfluenza canina (cepa Manhattan)..... 10^5 - 10^7 DICC₅₀
Excipiente c.b.p./c.s.p..... 1 dosis

La fracción líquida contiene *Leptospira interrogans* inactivadas:

Leptospira canicola no menos de 8.33×10^6 bacterias
Leptospira icterohaemorrhagiae no menos de 8.33×10^8 bacterias

Virus Rábico inactivado (cepa VP12) mínimo..... 1 U.I.
Vehículo c.b.p./c.s.p. 1 ml



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS
Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

Refuerzo anual a animales adultos.
Administrar como segunda inyección a cachorros mayores de 12 semanas de edad que hayan sido previamente vacunados con Quintuple con 3 a 4 semanas de anticipación.^{PPi/L}



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Elimine los envases vacíos mediante incineración.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Canigen[®] MHAPPi/L

2

No. de Reg. B-0042-018
USO VETERINARIO



Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus Canino, Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y antígenos inactivados contra la Leptospirosis canina.

Vacuna viva atenuada para la Inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus Canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina.

Antígenos inactivados para la inmunización activa contra la *Leptospirosis canina*.

PRESENTACIÓN
Caja con 10 dosis.



FÓRMULA

La fracción liofilizada contiene virus atenuados de:

Virus Distemper canino (cepa Lederle)..... 10^3 a $10^{4.9}$
 DICC₅₀ Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan). 10^4 a $10^{6.0}$
 DICC₅₀ Parvovirus canino (cepa CPV 780916).....
 10^5 a $10^{6.8}$ DICC₅₀ Parainfluenza canina (cepa Manhattan).....
 10^5 a $10^{6.9}$ DICC₅₀ Excipiente c.b.p..... 1 dosis

La fracción líquida contiene *Leptospira interrogans* inactivadas de:

Leptospira canicola 4350 - 7330
 U* 4250 - 6910

Leptospira icterohaemorrhagiae.

U*
 Vehículo c.b.p. 1 ml
 *Unidades ELISA de masa antigénica



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Complejo Respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina, Parvovirus canino y Leptospirosis canina.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS:
Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 semanas de edad seguida de una revacunación 3 a 4 semanas después. Refuerzo anual.

En perros mayores de 12 semanas de edad, puede ser administrada en conjunto con



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Canigen[®] MHA Puppy₂

No. de Reg. B-0042-016
USO VETERINARIO



Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 dosis.

FÓRMULA



FÓRMULA

Virus Distemper canino (cepa Lederle)..... 10^3 - 10^5
DICC₅₀ Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan).. 10^4 - 10^6 DICC₅₀ Parvovirus canino (cepa CPV 780916) 10^5 - 10^7 DICC₅₀ Excipiente c.b.p.
..... 1 dosis

Agua para inyectables c.b.p. 1 ml



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Parvovirus canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 a 9 semanas de edad seguida de una revacunación de 3 a 4 semanas después. En algunos casos, los anticuerpos de origen materno pueden interferir en la respuesta inmune a la vacunación. En estos casos, se recomienda una tercera administración 3 ó 4 semanas después. Refuerzo anual.



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Canigen® Puppy Extra

No. de Reg. B-0042-020
USO VETERINARIO



Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza canina.

PRESENTACIÓN
Caja con 10 dosis.

FÓRMULA



FÓRMULA

Virus Distemper canino (cepa Lederle)..... $10^3 - 10^{4.9}$
 DICC₅₀ Adenovirus canino tipo 2 (cepa
 Manhattan)..... $10^4 - 10^{6.0}$ DICC₅₀ Parvovirus canino (cepa
 CPV 780916)..... $10^5 - 10^{6.8}$ DICC₅₀ Parainfluenza
 canina (cepa Manhattan)..... $10^5 - 10^{6.9}$ DICC₅₀
 Excipiente c.b.p.1 dosis

Agua para inyectables c.b.p.1 ml



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS
Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 semanas de edad seguida de una revacunación 3 a 4 semanas después. En algunos casos, los anticuerpos de origen materno pueden influir en la respuesta inmune a la vacunación. En estos casos, se recomienda una tercera administración 3 ó 4 semanas después. Refuerzo anual.



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Canigen[®] MHAP/L₂

No. de Reg. B-0042-013
USO VETERINARIO



Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y antígenos inactivados contra la Leptospirosis canina.

Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Parvovirus canino y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2.

Antígenos inactivados para la inmunización activa contra la Leptospirosis canina.

PRESENTACIÓN
Caja con 10 dosis.

FÓRMULA

La fracción liofilizada contiene virus atenuados de:
Virus Distemper canino (cepa Lederle)..... $10^3 - 10^5$
DICC₅₀ Parvovirus canino (cepa CPV 780916)..... 10^5-10^7 DICC₅₀ Excipiente c.b.p.
.....1 dosis

Interrogans

Leptospira canicola..... 4350 - 7330 U (*)
Leptospira icterohaemorrhagiae..... 4250 - 6910 U (*)
Vehículo c.b.p. 1 ml
*Unidades ELISA de masa antigénica.

INDICACIONES

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2, Parvovirus canino y Leptospirosis canina.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS.
Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 semanas de edad seguida de una revacunación 3 a 4 semanas después. Refuerzo anual.

ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Canigen® MHAL₂

No. de Reg. B-0042-017
USO VETERINARIO



Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa, Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y antígenos inactivados contra la Leptospirosis canina.

Vacuna viva atenuada para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis infecciosa y Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2

FÓRMULA

Antígenos inactivados para la inmunización contra la Leptospirosis canina.

PRESENTACIÓN
Caja con 10 dosis.



FÓRMULA

Virus Distemper canino (cepa Lederle).....10³ - 10⁵
DICC₅₀ Adenovirus canino tipo 2 (cepa Manhattan)..10⁴
- 10⁶ DICC₅₀ Excipiente c.b.p./c.s.p.
..... 1 dosis

interrogans

Leptospira canicola..... 4350 - 7330 U (*)
Leptospira icterohaemorrhagiae..... 4250 - 6910 U (*)
Vehículo c.b.p./c.s.p. 1 ml
*Unidades ELISA de masa antigénica



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra Moquillo, Hepatitis Infecciosa, Complejo respiratorio causado por Adenovirus tipo 2 y Leptospira canina.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS
Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea.

Como primera vacunación aplique una dosis a cachorros de 8 semanas de edad seguida de 1 revacunación 3 a 4 semanas después. Refuerzo anual.



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Canigen® CPV Clone

No. de Reg. B-0042-024
USO VETERINARIO



Vacuna activa atenuada líquida para la inmunización activa contra el Parvovirus canino.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 dosis

FÓRMULA

Parvovirus Canino 2b
(CPV 2b) atenuado cepa CPV 39 $10^{5.6}$ - $10^{7.5}$ DICT₅₀
Excipiente c.b.p..... 1 ml

INDICACIONES

Para la inmunización activa contra el Parvovirus Canino (CPV 2b).



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS
Administrar 1 dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Subcutánea o intramuscular.

Como primera vacunación aplique una dosis entre las 5 y 6 semanas de edad, revacunar 2 o 3 semanas después.

Puede continuar la vacunación con los biológicos de la línea CANIGEN



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa.

No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO



Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra el Parvovirus canino.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 dosis



FÓRMULA

FÓRMULA

Parvovirus Canino vivo cepa atenuada Cornell CV P/780916..... 10⁵- 10⁷ DICC₅₀
Excipiente c.b.p..... 1 dosis

Agua para inyectables c.b.p..... 1 ml



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra el Parvovirus Canino.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Administrar una dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

Como primera vacunación aplique una dosis entre las 6 y 8 semanas de edad, seguida de revacunación a las 3 o 4 semanas, a criterio del Médico Veterinario. La administración de a partir de las 6 semanas de edad provee inmunidad activa en ausencia de anticuerpos maternos y animales seronegativos. Los anticuerpos de origen materno pueden en algunos casos influir en la respuesta inmune a la vacunación. En tales casos se recomienda una tercera administración a partir de las 15 semanas de edad. Refuerzo anual.



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

Rabigen® Mono

No. de Reg. B-0042-030
USO VETERINARIO



Vacuna antirrábica inactivada en suspensión cepa Pasteur para la inmunización activa contra la Rabia en caninos y felinos domésticos.

PRESENTACIÓN

Caja con 10 dosis.



FÓRMULA

Virus rábico inactivado cepa Pasteur VP12... 1 U.I.
Vehículo c.b.p/c.s.p..... 1 dosis



INDICACIONES

Para la inmunización activa contra la Rabia en caninos y felinos domésticos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Administrar una dosis de 1 ml.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Subcutánea.

Como primera vacunación a partir del mes de edad y revacunar cuando tengan 3 meses de edad (NOM). Puede usarse una vacuna hasta los 3 meses de edad a criterio del Médico Veterinario. Refuerzo anual.



ADVERTENCIAS

Vacune únicamente animales clínicamente sanos y libres de parásitos. Mantenga el producto en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa. No permita el congelamiento. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO