

## Alergias



Shampoo dermatológico hidratante e hipoalergénico para perros.

### PRESENTACIÓN

Envase 250 ML



### FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Piroctona olamina ..... 500 mg  
Vehículo c.b.p./Excipientes c.s.p. .... 100 ml



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### MODO DE USO

Después de mojar el pelo limpio del animal con agua tibia, aplicar el shampoo dermatológico esparciéndolo por todo el cuerpo en una cantidad suficiente para que se pueda enjabonar toda la superficie del animal. Masajear uniformemente el pelaje dejando que el producto permanezca en el pelo durante 10 minutos. Enjuagar enseguida. Aplicar una o dos veces por semana hasta la mejora del cuadro dermatológico, siguiendo siempre las recomendaciones del Médico Veterinario.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica cutánea



### ADVERTENCIAS

Para aplicación externa solamente. Lavarse las manos después de su uso. En caso de contacto con los ojos enjuagar abundantemente con agua.

es seguro y no se espera que cause reacciones adversas cuando es utilizado conforme a las recomendaciones de la etiqueta. Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de abrir el envase utilizar el contenido en un plazo no mayor a seis meses.



### INDICACIONES

está indicado en el tratamiento tópico y en la higiene regular de perros afectados por alergias y reacciones de hipersensibilidad cutánea, principalmente en aquellas agravadas por la hiperproliferación de hongos y bacterias sensibles a piroctona olamina, tales como, **Malassezia pachydermatis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus pseudintermedius y Staphylococcus epidermidis.**

establecimiento y el restablecimiento de la integridad de la piel. El ingrediente activo piroctona olamina actúa contra hongos y bacterias, controlando la proliferación y reduciendo la carga de alérgenos que representan factores que complican la dermatitis alérgica.

#### Tecnología SIS (Skin Innovative Science) Promueve la salud de la piel.

#### Glicotecnología

Mediante la presencia de los monosacáridos D-Manosa, L-Ramnosa y D-Galactosa y Alquil poliglucósido.

Promueve un efecto calmante y sobre los microorganismos que afectan la piel, provee un efecto antiadhesivo.

#### Defensinas

Mediante los extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (Ulmara) y *Peumus boldus* (Boldo).

Promueve las defensas antimicrobianas naturales de la piel que actúan en las capas internas y externas favoreciendo el equilibrio de las defensas naturales.

#### SK influx - Complejo Lipídico Cutáneo

Mediante la combinación exclusiva de ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres, similar a la que se encuentra en la piel normal.

Provee efecto humectante y restaurador.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

# Allerderm™ Spot on

## Alergias

DERMATOLOGÍA



Para todo tipo de piel, humecta y mantiene la integridad de la barrera de la piel y el balance microbiano.

**PRESENTACIÓN**  
Pipeta de 2 ML  
Pipeta de 4 ML



### FÓRMULA

Agua, Skin Lipid Complex™ (Complejo Lipídico Cutáneo: Ceramida 3, Ceramida 6 II, Ceramida 1, Colesterol, ácidos grasos), Glycotechnology (Glicotecnología: Ramnosa, Galactosa, Manosa), Defensin technology, (Tecnología de Defensinas: extracto de hojas de *Peumus boldus*, extracto de *Spiraea ulmaria*)



### INDICACIONES

Específicamente diseñado para la piel del perro y del gato.

#### Allerderm™ Spot-on Tecnología SIS ( Skin Innovative Science)

Promueve la salud de la piel.

#### Complejo Lipídico Cutáneo

Mediante la combinación exclusiva de ceramidas, colesterol y ácidos grasos libres, similar a la que se encuentra en la piel normal. Provee efecto humectante y restaurador.

#### Glicotecnología

Mediante la presencia de los monosacáridos D-Manosa, L-Ramnosa y D-Galactosa y Alquil poliglucósido. Promueve un efecto calmante y sobre los microorganismos que afectan la piel, provee un efecto antiadhesivo.

### Defensinas

Mediante los extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (Ulmaria) y *Peumus boldus* (Boldo).

Promueve las defensas antimicrobianas naturales de la piel que actúan en las capas internas y externas favoreciendo el equilibrio de las defensas naturales.



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### MODO DE USO

Abra la pipeta girando su tapa. Separe el pelaje hasta que la piel sea visible. Coloque la punta directamente sobre la piel y aplique suavemente el contenido de preferencia en áreas sensibles de la piel.

Aplicar 1 pipeta por semana (o hasta una pipeta diaria) durante 4 semanas, luego una pipeta por mes o según la indicación de su Médico Veterinario. Ante dudas, siempre CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN**  
Tópica cutánea.



### ADVERTENCIAS

Almacene en un lugar fresco y seco, preferentemente entre 50C y 250C.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO

## Alergias



DEJERÍA FOLIOLOGICOS

Solución oral para perros y gatos 100 mg/ml  
Antiinflamatorio y antiprurítico no esteroideo.

### PRESENTACIÓN

FRASCO de 15 ML o FRASCO 50 ML



### FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Ciclosporina ..... 100 mg  
Vehículo c.b.p./Excipientes c.s.p..... 1 ml



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

**DOSIS** Administrar 0.05 ml de Cyclavance® por kg

de peso (equivalente a 5 mg de ciclosporina/kg) 2 horas antes o después de la comida, diariamente hasta mejoría de los signos. Ver inserto anexo.

Administrar 0.07 ml de Cyclavance® por kg de peso (equivalente a 7 mg de ciclosporina/kg) mezclado con el alimento o directamente en el hocico, diariamente hasta la mejoría de los signos. Ver inserto anexo.

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Perros: Administrar por vía oral. Inicialmente se debe

administrar diariamente hasta la mejoría de los signos, esto generalmente sucede en un plazo de 4 a 8 semanas. Si no existe mejoría durante las primeras 8 semanas se debe suspender el tratamiento. Una vez que se han controlado satisfactoriamente los signos

únicos de la dermatitis atópica, puede administrarse cada 2 días. Si los signos se controlan, el Médico Veterinario puede recomendar administrar cada 3 a 4 días. Debe utilizarse la frecuencia de dosificación más baja para mantener la remisión de los signos clínicos.

La duración del tratamiento debe ajustarse a la respuesta del paciente. Se puede suspender el tratamiento cuando los signos hayan sido controlados. Si los signos reaparecen, se puede reanudar el tratamiento con una dosis diaria. En algunos casos serán necesarios varios ciclos de tratamiento.

Gatos: Administrar diariamente de forma inicial hasta observar una mejora clínica satisfactoria de los signos (manifestados por prurito intenso y presencia de lesiones como excoriaciones, dermatitis miliar, placas eosinofílicas y/o alopecia inducida). Esto puede ocurrir dentro de 4-8 semanas. El prurito severo y prolongado puede inducir un estado de ansiedad y por consecuencia un acicalamiento excesivo. Si es el caso, aunque el prurito disminuya después de la administración del tratamiento, la resolución de la alopecia inducida puede retardarse. Una vez que los signos de dermatitis alérgica son satisfactoriamente controlados el producto puede ser administrado cada dos días. En algunos casos donde los signos clínicos son controlados con dosificaciones cada dos días, el Médico Veterinario podrá decidir administrar el producto cada 3 a 4 días. La menor frecuencia efectiva de dosificación deberá ser usada para mantener la remisión de los signos clínicos.



### INDICACIONES

Tratamiento de manifestaciones crónicas de la dermatitis atópica en perros. Reduce la inflamación y prurito asociado con la dermatitis atópica. Tratamiento sintomático de dermatitis alérgica crónica en gatos.



### ADVERTENCIAS

No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa.

No administrar a perros de menos de seis meses de edad o que pesen menos de 2 kg.

No administrar en gatos que pesen menos de 2.3 kg, a reserva de la evaluación riesgo-beneficio del Médico Veterinario.

No usar en perros con historial de trastornos malignos o trastornos malignos progresivos.

No vacunar con vacunas vivas durante el tratamiento y hasta dos semanas antes y después del tratamiento. Consérvese a temperatura ambiente, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Una vez abierto el producto es estable hasta 6 meses.

## Alergias

DERMATOLOGÍA



*Hidrocortisona Aceponato  
Solución cutánea para uso en perros.*

### PRESENTACIÓN

Envase de 76 ml



### FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:  
Hidrocortisona Aceponato..... 0.584 mg  
Vehículo c.b.p..... 1 ml



### INDICACIONES

Para el tratamiento de prurito e inflamación causado por dermatosis en perros.

incorpora Hidrocortisona Aceponato (HCA), un innovador corticoesteroide indicado en el tratamiento de prurito e inflamación causada por dermatosis en perros.



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

#### DOSIS

Accionar el atomizador (2 veces). La dosis recomendada es de 1.52 µg de hidrocortisona aceponato/cm<sup>2</sup> de piel afectada al día.

#### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Tópica cutánea.



### ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Para aplicación externa solamente. En caso de contacto con los ojos y con las mucosas enjuague abundantemente con agua.

El producto debe conservarse en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa, máximo 30 °C. Para uso externo solamente.

Destruir el envase una vez que se ha utilizado

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

## Alergias



Comprimidos para perros.

DERMATOLOGICOS

**PRESENTACIÓN**  
Caja con 10 comprimidos



### FÓRMULA

Cada comprimido de 600 mg contiene:  
Prednisolona..... 20 mg  
Excipientes c.b.p..... 1 comprimido



### INDICACIONES

Indicado en perros como antiinflamatorio para algunas enfermedades neurológicas (enfermedad discal); dermatitis atópica; otitis externa; procesos alérgicos en los que se recomienda el uso de corticoides; enfermedades inmunomediadas o autoinmunes como lupus eritematoso sistémico, complejo pénfigo, trombocitopenia inmunomediada, anemia hemolítica inmunomediada, poliartritis inmunomediada; como parte de protocolos quimioterapéuticos para tumores linfoides, de mastocitos y tumores cerebrales.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO  
USO VETERINARIO



### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

	mg / Kg de peso perro	Comp / 10 kg de peso perro	Cantidad y tiempo
Antiinflamatorio y cuadros alérgicos (Fase inducción)	0.5 - 1 mg	1/4 a 1/2 de comprimido	1 o 2 veces/día durante 5 - 7 días
Inmunesupresor (Fase inducción)	2 - 4 mg	1 o 2 comprimidos durante 10 - 28 días	
Coadyuvante terapias oncológicas (Fase inducción)	2 mg	1 comprimido	o 2 veces al día durante 3 - 4 semanas

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral.



### ADVERTENCIAS

No usar en hembras preñadas, lactancia o animales reproductores.

No usar en cuadros de infecciones bacterianas, virales o micóticas sistémicas.

No usar en animales con úlceras gastrointestinales, corneales o en cuadros de hiperadrenocorticismo. Monitorear la aparición de signos relacionados con hiperadrenocorticismo iatrogénico como poliuria, polidipsia, polifagia y jadeo.

Utilizar con precaución en perros jóvenes, diabéticos, hipertensos e inmunodeprimidos.