

Óticos



Limpiador auricular
Solución ótica para la higiene del conducto auditivo
y pre-tratamiento de las otitis externas de perros y gatos.

PRESENTACIÓN

Envase de 100 ml



FÓRMULA

Cada 100 ml contienen:

Ácido salicílico 200 mg
Vehículo c.b.p./excipientes c.s.p. 100 ml



INDICACIONES

está indicado para el mantenimiento de la higiene regular del conducto auditivo y antes del tratamiento de otros productos para otitis externas en los perros y gatos.

Tecnología SIS (Skin Innovative Science)
Promueve la salud de la piel.

Glicotecnología

Mediante la presencia de los monosacáridos D-manosa, L-ramnosa y D-galactosa. Promueve un efecto calmante y sobre los microorganismos que afectan la piel provee un efecto antiadhesivo

Defensinas

Mediante los extractos vegetales de las especies *Filipendula ulmaria* (Ulmaria) y *Peumus boldus* (Boldo). Promueve las defensas antimicrobianas naturales de la piel que actúan en las capas internas y externas favoreciendo el equilibrio de las defensas naturales.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

MODO DE USO

aplicar cantidad suficiente de producto en un algodón seco y limpiar las áreas externas de la oreja de una a dos veces por semana.

aplicar cada 12 h, de 3 a 5 días antes de la aplicación del agente terapéutico o según recomendación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ótica



ADVERTENCIAS

Para aplicación externa solamente. Lavarse las manos después de su uso. En caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua.

es seguro y no se espera que cause reacciones adversas cuando es utilizado conforme a las recomendaciones de la etiqueta. En casos aislados pueden ocurrir reacciones no esperadas en función de las características individuales de cada paciente.

Los animales con tímpano perforado, antes de usar cualquier producto, deben ser revisados por el Médico Veterinario.

Manténgase en un lugar fresco y seco a temperatura ambiente (entre 15°C a 30°C), al abrigo de la luz solar directa, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Después de abrir el envase, utilizar el contenido en un plazo no mayor a seis meses.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Óticos



DERMATOINFECCIONES



Suspensión ótica para perros.

PRESENTACIÓN

Envase de 10 ml



FÓRMULA

Hidrocortisona aceponato	1.11 mg
Miconazol (nitrato)	15.1 mg
Gentamicina (sulfato).....	1505 UI
Excipiente c.b.p./c.s.p.....	1 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de la otitis externa asociada con bacterias sensibles a la gentamicina, (especialmente ***Staphylococcus pseudintermedius***, ***Streptococcus spp***, ***Pseudomonas aeruginosa***, ***Proteus mirabilis***, ***Escherichia coli***) y hongos/levaduras sensibles al miconazol principalmente ***Malassezia pachydermatis***.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Administrar 1 ml de producto por oído, equivalente a 1.11 mg/ml de hidrocortisona aceponato, 15.1 mg/ml de miconazol y 1505 UI/ml de gentamicina.

Repetir el tratamiento una vez al día durante 5 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ótica.



ADVERTENCIAS

No administrar en caso de hipersensibilidad a cualquiera de los ingredientes.
Manténgase en un lugar fresco y seco, a temperatura ambiente (30°C máximo).
Consérvese en su envase original perfectamente cerrado.
No exponerlo a luz solar directa.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Producto de uso exclusivo en Medicina veterinaria.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Óticos



Solución ótica para perros.

PRESENTACIÓN

Envase de 16 ml



FÓRMULA

Hidrocortisona aceponato 0.584 mg
Vehículo c.b.p./ excipientes c.s.p..... 1 ml



INDICACIONES

Para el tratamiento de la otitis externa aguda no supurativa en perros en presencia de bacterias y/o levaduras.



ADVERTENCIAS

No usar en casos de hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes.
No lo use si el tímpano está perforado.

USO VETERINARIO.
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Administrar 0.44 ml por oído afectado una vez al día durante 7 días consecutivos.

MODO DE USO.

Se recomienda limpiar y secar el conducto auditivo externo antes del primer tratamiento. Antes de la primera administración, retire la tapa y enrosque la bomba de aerosol en el frasco. Luego cargue la bomba presionándola hasta que se libere el producto.

La dosis recomendada es de 0.44 ml por oído afectado una vez al día durante 7 días consecutivos. Esta dosis se administra adecuadamente mediante dos activaciones de la bomba.

Introduzca la cánula atraumática en el canal auditivo. Sostenga el producto en posición vertical mientras administra el producto en el (los) oído(s) afectado(s).

Mantenga la bomba atornillada después de su uso. Si el Médico Veterinario considera que la afección no está completamente curada en un plazo de 7 días, el tratamiento puede extenderse hasta 14 días. Si la bomba no se ha utilizado durante mucho tiempo, actívela una vez antes de volver a aplicar el spray.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Ótica.