

MILPRO®

No. de Reg. Q-0042-443 (4 mg/10 mg)
No. de Reg. Q-0042-445(16 mg/40 mg)
USO VETERINARIO

4 mg/10 mg y 16 mg/40 mg

Endoparasiticidas

Línea para gato



Tabletas palatables para cachorros y gatos adultos.

PRESENTACIÓN

Caja con 4 tabletas



FÓRMULA

Cada tableta contiene:		
	Milbemicina oxima	Praziquantel
	4.0 mg	10.0 mg
	16 mg	40 mg
Excipientes c.b.p.1 tableta		



INDICACIONES

está indicado para el tratamiento de infestaciones combinadas de céstodos inmaduros y adultos (taenias) y nemátodos (gusanos redondos) de las especies **Dipylidium caninum**, **Taenia spp.**, **Echinococcus multilocularis**, **Ancylostoma tubaeforme** y **Toxocara cati**. El producto también puede ser usado en la prevención de gusano del corazón (**Dirofilaria immitis**) si el tratamiento concomitante contra céstodos también está indicado.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral. Puede administrarse con o después del alimento.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La dosis mínima recomendada es de 2 mg de DOSIS

milbemicina oxima y 5 mg de praziquantel por kg, como dosis única.

Dependiendo del peso del gato, la dosis práctica se muestra en la siguiente tabla:

Peso	Tipo de tableta	Tabletas
0.5 - 1 kg		½ tableta
>1 - 2 kg		1 tableta
2- 4 kg		½ tableta
>4 - 8 kg		1 tableta
>8 - 12 kg		1 ½ tabletas



ADVERTENCIAS

4 mg/10 mg no deberá ser administrado en cachorros de menos de 6 semanas de edad y/o que pesen menos de 0.5 kg.
MILPRO® 16 mg/40 mg no deberá ser administrado en gatos que pesen menos de 2 kg.
No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas.
El producto puede ser usado en gatas lactantes, gatas gestantes y gatas reproductoras a recomendación del Médico Veterinario.
Manténgase alejado de los niños y animales domésticos.
Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

MILPRO®

No. de Reg. Q-0042-446 (2.5 mg / 25 mg)
No. de Reg. Q-0042-447 (12.5 mg/125 mg)
USO VETERINARIO

2.5 mg / 25 mg y 12.5 mg / 125 mg

Endoparasiticidas

Línea para perro



Tabletas palatables para cachorros y perros adultos.

ANTIPARASITARIOS

PRESENTACIÓN
Caja con 4 tabletas



FÓRMULA

Cada tableta contiene:		
	Milbemicina oxima	Praziquantel
MILPRO 2.5 mg / 25 mg	2.5 mg	25 mg
MILPRO 12.5 mg / 125 mg	12.5 mg	125 mg
Excipientes c.b.p.		1 tableta



INDICACIONES

está indicado para el tratamiento de infestaciones combinadas de céstodos y nemátodos de las especies **Dipylidium caninum**, **Taenia spp.**, **Echinococcus spp.**, **Mesocostoides spp.**, **Ancylostoma caninum**, **Toxocara canis**, **Toxascaris leonina**, **Trichuris vulpis**, **Crenosoma vulpis** (reducción del nivel de infección), **Angiostrongylus vasorum** (reducción del nivel de infección). El producto también puede ser usado en la prevención de gusano del corazón (**Dirofilaria immitis**) si el tratamiento concomitante contra céstodos también está indicado. En casos en que se requiera prevención contra el gusano del corazón y al mismo tiempo tratamiento contra tenias, puede reemplazar el tratamiento monovalente para la prevención de gusano del corazón.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

La dosis mínima recomendada es de 0.5 mg de milbemicina oxima y 5 mg de praziquantel por kg, como dosis única.

Dependiendo del peso del perro, la dosis práctica se muestra en la siguiente tabla:

Peso	Tipo de tableta	Tabletas
0.5 - 1 kg		½ tableta
>1 - 5 kg		1 tableta
>5- 10 kg		2 tabletas
5 - 25 kg		1 tableta
>25 - 50 kg		2 tabletas
>50 - 75 kg		3 tabletas

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral. Puede administrarse con o después del alimento.



ADVERTENCIAS

no deberá ser administrado en cachorros de menos de 2 semanas de edad y/o que pesen menos de 0.5 kg. No usar en caso de hipersensibilidad a las sustancias activas.

no debe utilizarse en perros que pesen menos de 5 kg. El producto puede ser usado en perras lactantes, perras gestantes y perras reproductoras a recomendación del médico veterinario. Manténgase alejado de los niños y animales domésticos. Almacenar a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. No usar en gatos.



Endoparasitica de amplio espectro en pasta para perros y gatos.

ANTIPARASITARIOS

PRESENTACIÓN
Jeringa de 10 ml o 25 ml



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:
Oxibendazol..... 45 mg
Niclosamida..... 240 mg
Excipiente c.b.p..... 1 ml



INDICACIONES

es un endoparasitica de amplio espectro. Contiene oxibendazol y niclosamida, los cuales permanecen exclusivamente a nivel gastrointestinal, por lo que es muy seguro y actúa contra los principales gusanos redondos y planos de los perros y gatos.

: *Toxocara canis*, *T. cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *A. braziliense* y *Uncinaria stenocephala*.

: *Dipylidium caninum* y *Taenia spp.*



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS.

Administrar 1 ml por cada 2 kg de peso (equivalente a 22.5 mg/kg de oxibendazol y 120 mg/kg de niclosamida). Cada graduación permite tratar 10 kg de peso.

Se recomienda desparasitar a partir de los dos meses de edad con intervalos de 15 días. En caso de infestaciones severas se podrá administrar una segunda dosis a las 48 horas después de la primera toma. La frecuencia dependerá del grado de infestación según el medio ambiente, la edad del animal y el estado reproductivo o a recomendación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oral, directa o con el alimento.



ADVERTENCIAS

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Consérvese en su empaque original.
Consérvese a temperatura ambiente.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

EFFIPRO® DUO

No. de Reg. Q-0042-469 (Cat)
No. de Reg. Q-0042-464 (Kitten)
USO VETERINARIO

Ectoparasiticidas gatos



Solución spot - on
Antiparasitario externo para gatos.

ANTIPARASITARIOS

PRESENTACIÓN

Caja con 2 pipetas



FÓRMULA

	Fipronil	Piriproxifen
EFFIPRO® DUO (0.50 ml)	50 mg	60 mg
EFFIPRO® DUO (1.0 ml)	100 mg	120 mg
EFFIPRO® Vehículo c.b.p.....	0.50 ml	
EFFIPRO® Vehículo c.b.p.	1 ml	



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Aplicar una pipeta por gato de acuerdo al peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía percutánea. Solo para uso externo.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



INDICACIONES

EFFIPRO® DUO Kitten y Cat están indicados en gatos contra infestaciones de pulgas y garrapatas.

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Un tratamiento previene futuras infestaciones por 5 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas mediante la prevención del desarrollo de huevos a pulgas adultas por 12 semanas después de la aplicación. El producto puede ser usado como parte de un tratamiento estratégico para el control de Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP) cuando esta ha sido previamente diagnosticada por un Médico Veterinario.

Tratamiento de infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Rhipicephalus turanicus*).

Un tratamiento provee eficacia acaricida persistente por una semana. Si las garrapatas están presentes al tiempo de la aplicación, no todas las garrapatas morirán dentro de 48 horas.



ADVERTENCIAS

Consérvese a menos de 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz. Guardar en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Nocivo en caso de ingestión.

No usar en conejos.

EFFIPRO® DUO

No. de Reg. Q-0042-463 (Small)
 No. de Reg. Q-0042-470 (Medium)
 No. de Reg. Q-0042-471(Large)
 No. de Reg. Q-0042-472 (Extra large)
 USO VETERINARIO

Ectoparasiticidas perros



Solución spot - on
 Antiparasitario externo para perros.

PRESENTACIÓN

Caja con 2 pipetas



FÓRMULA

	Contenido de pipeta	Fipronil	Piriproxifen
EFFIPRO® DUO	0.67 ml	67 mg	20.1 mg
EFFIPRO® DUO	1.34 ml	134 mg	40 mg
EFFIPRO® DUO	2.68 ml	268 mg	80.4 mg
EFFIPRO® DUO	4.02 ml	402 mg	120.6 mg



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Aplicar una pipeta por perro de acuerdo al peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía percutánea.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
 SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



INDICACIONES

está indicado contra infestaciones de pulgas y garrapatas.

Tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*). Un tratamiento previene futuras infestaciones por hasta 7 semanas. Prevención de la multiplicación de pulgas mediante prevención del desarrollo de huevos a pulgas adultas por 12 semanas después de la aplicación. El producto puede ser usado como parte de un tratamiento estratégico para el control de Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga (DAPP) cuando esta ha sido previamente diagnosticada por un Médico Veterinario.

Contra garrapatas:

Tratamiento de infestaciones por garrapatas.

Un tratamiento provee eficacia acaricida persistente por 4 semanas contra *Rhipicephalus sanguineus*.

Si las garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) están presentes al tiempo de la aplicación, no todas las garrapatas morirán dentro de 48 horas.



ADVERTENCIAS

Consérvese a menos de 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz. Guardar en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Nocivo en caso de ingestión.

No usar en conejos y gatos.

EFFIPRO® SPRAY

No. de Reg. Q-0042-465
USO VETERINARIO

Ectoparasiticidas



everyday
CARE

Solución
Antiparasitario externo para perros y gatos.

ANTIPARASITARIOS

PRESENTACIÓN
Envase de 100 ml o 250 ml



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Fipronil 2.5 mg
Vehículo c.b.p..... 1 ml



INDICACIONES

EFFIPRO® SPRAY está indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor reticulatus* e *Ixodes ricinus*) en perros y gatos. El producto tiene eficacia acaricida persistente hasta por 4 semanas contra garrapatas. Indicado como parte de un tratamiento estratégico para Dermatitis Alérgica por Picadura de Pulga.

En *Trichodectes canis* piojo infestaciones en perros, y *Felicola subrostratus* piojo mordedor en gatos.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS

Para humedecer el pelo hasta la piel, aplicar 3 a 6 ml por kg de peso (7.5 a 15 mg de ingrediente activo por kg de peso), dependiendo de la longitud del pelo.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Viá percutánea. Sólo para uso externo.



ADVERTENCIAS

No usar en animales enfermos (enfermedades sistémicas, fiebre) o convalecientes.

No usar en conejos, puede ocurrir la muerte.

No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

EFFITIX®

Ectoparasiticidas

No. de Reg. Q-0042-444
USO VETERINARIO



everyday
CARE

ANTIPARASITARIOS



Solución spot - on
Antiparasitario externo para perros.

PRESENTACIÓN
Caja con 2 pipetas



FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

Fipronil 61 mg
Permetrina 545 mg
Vehículo c.b.p. 1 ml

Peso corporal	Presentación	Fipronil (mg)	Permetrina (mg)
Perros 1.5 - 4 kg	0.44 ml	26.8	240
Perros 4 - 10 kg	1.1 ml	67	600
Perros 10 - 20 kg	2.2 ml	134	1200
Perros 20 - 40 kg	4.4 ml	268	2400
Perros 40 - 60* kg	6.6 ml	402	3600

* Para perros con un peso superior a 60 kg, se debe utilizar una combinación adecuada de pipetas.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

DOSIS
Aplicar una pipeta por perro de acuerdo al peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Vía percutánea. Solo para uso externo.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA



ADVERTENCIAS

Consérvese a menos de 30°C, en un lugar seco y protegido de la luz. Guardar en su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Nocivo en caso de ingestión.

No usar en conejos y gatos.



INDICACIONES

EFFITIX® está indicado en caninos para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp*). Las pulgas mueren dentro de las 24 horas siguientes al tratamiento.

Un tratamiento provee eficacia persistente contra nuevas infestaciones con pulgas adultas por cuatro semanas. El producto puede ser usado como parte de un tratamiento estratégico para el control de la dermatitis alérgica por picadura de pulga cuando esta condición ha sido previamente diagnosticada por el Médico Veterinario.

El producto tiene una eficacia acaricida inmediata contra garrapatas (*Ixodes ricinus* y *Dermacentor reticulatus*). Una aplicación provee eficacia acaricida persistente contra infestaciones por garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor*

reticulatus y *Rhipicephalus sanguineus*) por cuatro semanas. Si las garrapatas están presentes al tiempo de la aplicación, podría ser que no todas las garrapatas mueran dentro de 48 horas, pero morirán dentro de una semana.

La administración de un tratamiento provee actividad repelente (antipicadura) contra moscas de arena (*Phlebotomus perniciosus*) y contra mosquitos (*Culex pipiens*, *Aedes aegypti*) por cuatro semanas.