

Virbagen® Omega

No. de Reg. B-0042-025
USO VETERINARIO



Interferón Omega Recombinante de Origen Felino.

PRESENTACIÓN

Frasco con 10 MU



FÓRMULA

Interferón Omega recombinante de origen felino ...10 MU
Excipiente c.b.p./c.s.p. 1 dosis

Solución isotónica de cloruro de sodio..... 1 ml

Producto derivado de un organismo modificado genéticamente.



INDICACIONES

Reducción de la mortalidad y de los signos clínicos de la parvovirus (forma entérica) en los perros a partir de 1 mes de edad.

Tratamiento de las infecciones por FeLV o por FIV, durante una fase clínica no terminal en gatos mayores de 9 semanas. Durante la realización de un ensayo de campo se observó:

Reducción de los signos clínicos durante la fase sintomática (4 meses)

Reducción de la mortalidad:

- En los gatos con anemia el índice de mortalidad oscila alrededor del 60%, a los 4, 6, 9 y 12 meses se reduce aproximadamente el 30% después del tratamiento con Interferón.

- En los gatos no anémicos pero infectados por FeLV el índice de mortalidad del 50% se redujo a un 20% después del tratamiento con Interferón. En gatos infectados por FIV el índice de mortalidad es más bajo (5%) y no se ve afectado por el tratamiento.



DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La fracción liofilizada tiene que ser reconstituida con 1 ml del disolvente específico para obtener una solución que contiene 10 MU de Interferón recombinante.

El producto reconstituido tiene que ser inyectado por vía intravenosa una vez al día, durante 3 días consecutivos.

La dosis es de 2.5 MU/kg de peso.

El producto reconstituido tiene que ser inyectado por vía subcutánea una vez al día durante 5 días consecutivos. La dosis es de 1 MU/kg de peso. Tres tratamientos distintos de 5 días tienen que ser administrados en el día 0, día 14 y día 60.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intravenosa.

Vía subcutánea.



ADVERTENCIAS

Después del tratamiento con Virbagen® Omega está contraindicada hasta la recuperación aparente del animal. Esperar al menos 15 días entre la aplicación del Virbagen® Omega y la vacunación.

Gatos: Como toda vacunación está contraindicada durante la fase sintomática de infecciones FeLV/FIV, Omega en la vacunación del

el efecto de gato no fue evaluado.

Manténgase en refrigeración entre 20C y 80C y en estricta protección de la luz solar directa.

No permita el congelamiento.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos