




ACACED Chiens  
**PARTIE 9**

**Les bases de la santé  
canine**  
**PARTIE 2**

### III – Les principales maladies canines

#### A – Les principales maladies virales du chien

**LA RAGE** (*lyssavirus*). Zoonose et maladie catégorisée BDE.

##### SYMPTOMES POSSIBLES

Changements comportementaux (agressivité ou apathie), hyperesthésie (augmentation de la sensibilité à la douleur ou au toucher), spasmes (en particulier au niveau de la mâchoire), convulsions, hypersalivation, paralysie, coma.

##### INCUBATION & DEPISTAGE

Incubation : 15 à 60 jours.  
Aucun dépistage. Le diagnostic chez l'animal est exclusivement post-mortem, à partir de prélèvements cérébraux.

##### CONTAMINATION & TRANSMISSION

Contact direct avec de la salive contaminée (morsure, griffure, léchage) sur une muqueuse ou une plaie.

##### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

Elle est toujours mortelle dès l'apparition de symptômes.  
Vaccination dès 12 semaines, renouvelable tous les 1 à 3 ans selon les vaccins.  
Vaccination obligatoire en cas de voyage à l'étranger et pour les chiens catégorisés.

**LA PARVOVIROSE** (*parvovirus canin*). Vice rédhibitoire canin.

**SYMPTOMES**

Abattement, perte d'appétit, trouble digestifs (souvent une diarrhée sévère et très caractéristique, parfois hémorragique, et vomissements), déshydratation, fièvre.

**INCUBATION & DEPISTAGE**

Incubation : 4 à 10 jours.  
Test de dépistage par analyse de selles.

**CONTAMINATION & TRANSMISSION**

Virus très virulent, et donc très contagieux, qui se transmet par contact direct ou indirect (via des surfaces, des vêtements ou du matériel contaminé) avec des selles contaminées.

**GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

C'est une maladie grave pour laquelle il n'existe aucun traitement, souvent mortelle en particulier chez les chiots. Seuls les symptômes peuvent être traités jusqu'au rétablissement de l'animal, qui requiert parfois une hospitalisation (anti-vomitifs, anti-diarrhéiques, réhydratation intraveineuse, nourrissage par sonde).  
Vaccination dès 8 semaines, renouvelable tous les ans.

## **LA MALADIE DE CARRE** (*paramyxovirus*). Vice rédhibitoire canin.

### **SYMPTOMES**

Les symptômes sont variés et peu caractéristiques.

Abattement, perte d'appétit, forte fièvre, problèmes oculaires (larmolement, conjonctivite, uvéite), digestifs (vomissements et diarrhée parfois hémorragique), dermatologique (hyperkératose de la truffe et des coussinets, rougeurs, pustules), nerveux (paralysie, convulsions, perte d'équilibre) et respiratoires (toux, sifflements, écoulements nasaux purulents).

### **CONTAMINATION & TRANSMISSION**

Contact direct avec des sécrétions corporelles (salive, selles, urine, écoulements oculaires et nasaux) contaminées.

La contamination par contact indirect est plus rare, car le virus ne résiste pas à la chaleur.

### **INCUBATION & DEPISTAGE**

Incubation : 3 à 7 jours.

Dépistage par analyse sanguine principalement.

### **GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

C'est une maladie grave, souvent mortelle, pour laquelle il n'existe aucun traitement et qui peut causer des séquelles irréversibles. Seuls les symptômes peuvent être traités jusqu'au rétablissement de l'animal, qui requiert parfois une hospitalisation (anti-inflammatoires, antiviraux, anti-vomitifs, anti-diarrhéiques, réhydratation intraveineuse, nourrissage par sonde).

Vaccination dès 8 semaines, renouvelable tous les ans.

**L'HEPATITE DE RUBARTH** (*adenovirus canin*). Vice rédhibitoire canin.

**SYMPTOMES**

Les symptômes sont variés et peu caractéristiques.

Abattement, perte d'appétit, fièvre, troubles digestifs (diarrhée, vomissements), troubles oculaires, troubles rénaux, troubles de la coagulation, hypertrophie des ganglions, nécrose des organes, en particulier du foie.

**CONTAMINATION & TRANSMISSION**

Virus très contagieux qui peut résister plusieurs semaines dans les sécrétions corporelles et en extérieur.

Transmission par contact direct ou indirect (via des surfaces, des vêtements ou du matériel contaminé) avec des selles, des urines ou des sécrétions nasales ou oculaires contaminées.

**INCUBATION & DEPISTAGE**

Incubation : 3 à 6 jours.

Dépistage par analyse sanguine ou urinaire.

**GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

C'est une maladie grave, souvent mortelle, pour laquelle il n'existe aucun traitement. Il existe une forme suraigüe chez les jeunes chiens qui est mortelle dans 100 % des cas. Seuls les symptômes peuvent être traités jusqu'au rétablissement de l'animal, qui requiert parfois une hospitalisation (anti-inflammatoires, antiviraux, anti-vomitifs, anti-diarrhéiques, réhydratation intraveineuse, nourrissage par sonde).

Vaccination dès 8 semaines, renouvelable tous les ans.

**LA TOUX DU CHENIL** co-infection de virus (*parainfluenza canin*, *adenovirus canin*, *influenza canin*, *réovirus*) et de bactéries (*Bordetella bronchiseptica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma*).

### **SYMPTOMES**

Troubles respiratoires : toux sèche, forte et rauque.

### **INCUBATION & DEPISTAGE**

Incubation : 3 à 10 jours.

Dépistage par analyse sanguine ou d'échantillons respiratoires.

### **CONTAMINATION & TRANSMISSION**

Contact direct rapproché avec un animal contaminé.

### **GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

C'est une maladie très contagieuse, mais rarement grave, qui se soigne bien si elle est prise à temps. Des risques de surinfections existent (pneumonie, surinfection bactérienne) si elle n'est pas soignée rapidement. Son traitement dépend de la source de l'infection : antibiotiques, analgésiques et anti-inflammatoires, bronchodilatateurs.

Vaccination dès 8 semaines, renouvelable tous les ans.

## L'HERPESVIROSE (*alpha herpèsvirus canin*)

### SYMPTOMES

Chez l'adulte : l'infection est souvent asymptomatique. Le virus est latent et peut être activé (en périodes de stress ou de maladie), ce qui peut causer des lésions sur les muqueuses génitales, des troubles oculaires ou respiratoires.

Chez le nouveau-né : troubles digestifs (diarrhée, vomissements) et nerveux (tremblements, défauts de coordination) et une hypothermie.

### CONTAMINATION & TRANSMISSION

Contact direct avec des sécrétions corporelles contaminées et par accouplement avec un individu contaminé.

Transmission in-utero ou par l'enveloppe fœtale pour les nouveau-nés.

### INCUBATION & DEPISTAGE

Incubation : 6 à 10 jours.

Dépistage par analyse sanguine ou tests sérologiques.

### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

Le virus est souvent latent chez les adultes et ne s'exprime qu'en cas de stress ou de maladie. Il est en revanche mortel pour la plupart des nouveau-nés d'une mère séropositive et est à l'origine de nombreux avortements et de problèmes de stérilité. Les chiots infectés avant l'âge de 3 semaines peuvent développer des dysfonctionnements du système nerveux (surdité ou cécité).

Il n'existe aucun traitement et l'animal affecté l'est à vie.

Un vaccin existe pour la chienne reproductrice, qui sert avant tout à protéger ses chiots. Renouvelable à chaque gestation.

## B – Les principales maladies bactériennes du chien

### **LA LEPTOSPIROSE** (*Leptospira interrogans*). Zoonose.

#### **SYMPTOMES**

Les symptômes dépendent de la forme de l'infection : troubles digestifs (vomissements et diarrhée hémorragiques), oculaires (ictère, uvéite), de la coagulation, insuffisance rénale et atteinte du foie et de la rate.

#### **CONTAMINATION & TRANSMISSION**

C'est une maladie vectorielle, véhiculée dans les urines des rongeurs (rats en particulier). La bactérie se développe dans les eaux stagnantes et le sol.

Transmission par voie orale (par ingestion d'eau contaminée) et par la peau (par baignade dans de l'eau contaminée).

#### **INCUBATION & DEPISTAGE**

Incubation : environ 7 jours.

Dépistage par analyse sanguine et échographie.

#### **GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

C'est une maladie très grave au taux très élevé de mortalité. Elle peut être traitée efficacement si elle est diagnostiquée assez tôt, mais elle nécessite souvent une hospitalisation (perfusion et antibiotiques intra-veineux).

Il existe une forme suraiguë de l'infection qui entraîne la mort en 48 heures sans signes cliniques.

Vaccination dès 8 semaines, renouvelable tous les ans.

## LA MALADIE DE LYME (*Borrelia burgdorferi*). Zoonose.

### SYMPTOMES

C'est une maladie souvent asymptomatique, qui peut causer fièvre, fatigue puis troubles articulaires, nerveux, cardiaques et rénaux dans les formes aiguës et en l'absence d'un traitement précoce.

### CONTAMINATION & TRANSMISSION

C'est une maladie vectorielle, véhiculée par certaines tiques.  
Transmission par morsure de tique.

### INCUBATION & DEPISTAGE

Incubation : 2 à 5 mois.

Diagnostic compliqué qui repose sur le contexte (mode de vie du chien, présence de tiques), les signes cliniques et divers examens complémentaires.

### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

C'est une maladie handicapante qui peut présenter de lourdes complications en cas de traitement tardif. Le chien peut rester porteur de la bactérie pendant plusieurs mois même après un traitement antibiotique prolongé. Les soins peuvent inclure des anti-inflammatoires pour soulager les douleurs articulaires. Il est nécessaire d'inspecter l'animal après chaque promenade, surtout par temps chaud, et de retirer les tiques à l'aide d'un tire-tiques le plus rapidement possible.

Vaccination dès 12 semaines, renouvelable tous les ans voire tous les 6 mois selon le mode de vie du chien, à combiner avec un traitement antiparasitaire adapté et régulier.

**LA MAMMITE** (*Escherichia coli*, *staphylocoques* ou *streptocoques*).

**SYMPTOMES**

C'est une inflammation bactérienne d'une ou de plusieurs chaînes mammaires. Les symptômes dépendent de sa forme : bénigne ou aiguë. Des complications peuvent survenir avec l'apparition d'abcès. Gonflements, rougeurs, chaleur, douleur, fièvre, abattement.

**INCUBATION & DEPISTAGE**

Dépistage par analyse sanguine ou de lait.

**CONTAMINATION & TRANSMISSION**

C'est une maladie qui survient surtout en période d'allaitement, lorsque les tétones sont sollicitées par la tétée.

**GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

Le traitement s'effectue à base d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires pour la douleur. Si elle est non traitée, elle peut évoluer en septicémie. L'infection peut contaminer le lait (syndrome du lait toxique), ce qui est surtout dangereux pour les chiots.

Il n'existe pas de vaccin, mais elle peut être prévenue en maintenant un bon niveau d'hygiène du local dans lequel les animaux sont placés.

## C – Les principales maladies fongiques du chien

**LA TEIGNE** (champignons de type *Microsporum*). Zoonose.

### SYMPTOMES

Perte de poils, souvent circulaire, rougeurs, peau sèche, croûtes, déformation des griffes (si l'infection se propage à la patte).

### CONTAMINATION & TRANSMISSION

Transmission par contact direct ou indirect (via des surfaces, des vêtements ou du matériel contaminé).

Elle se manifeste plus facilement chez les animaux parasités ou immunodéprimés.

### INCUBATION & DEPISTAGE

Dépistage par lampe de Wood (lumière UV) ou culture mycologique.

### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

Ce n'est pas une maladie grave, mais elle est très contagieuse et longue à traiter (par médicaments ou solutions antifongiques). Les spores sont également très difficiles à éliminer, et une désinfection complète de toutes les surfaces ayant été en contact avec l'animal contaminé est fortement recommandée.

Un traitement antiparasitaire adapté et régulier, un protocole de vaccination et une bonne hygiène du pelage et de l'environnement sont recommandés pour prévenir la teigne.

## D – Les principales maladies parasitaires du chien

### LA PIROPLASMOSE (piroplasme *Babesia canis*).

#### SYMPTOMES

Abattement brutal, perte totale d'appétit, forte fièvre, coloration anormale des urines (orange, rouge ou marron).

Dans certains cas, peuvent se rajouter : troubles nerveux, jusqu'à une paralysie, nécroses cutanées, hémorragie rétinienne.

#### INCUBATION & DEPISTAGE

Incubation : 7 à 21 jours.

Dépistage par analyse sanguine.

#### CONTAMINATION & TRANSMISSION

C'est une maladie vectorielle, véhiculée par certaines tiques.

Transmission par morsure de tique.

#### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

Un traitement commencé tôt, à base de piroplasmicides, permet un bon pronostic avec une récupération complète possible. Mais si l'infection est sévère et si le traitement est tardif, des complications telles qu'une insuffisance rénale ou hépatique peuvent survenir, et une hospitalisation est souvent nécessaire.

Il est nécessaire d'inspecter l'animal après chaque promenade, surtout par temps chaud, et de retirer les tiques à l'aide d'un tire-tiques le plus rapidement possible.

Un vaccin est disponible dès 5 mois, renouvelable tous les ans voire tous les 6 mois selon le mode de vie du chien et qui doit être espacé d'au moins 1 mois avec les autres vaccins, mais il doit être combiné avec un protocole antiparasitaire adapté et régulier.

## **LA LEISHMANIOSE** (protozoaire *Leishmania*). Zoonose.

### **SYMPTOMES**

Lésions cutanées (perte de poil, ulcères, croûtes), troubles locomoteurs (boiterie), oculaires (conjonctivite), saignements de nez, perte musculaire et de poids, fièvre.

Dans les cas les plus graves : troubles nerveux, rénaux, hépatiques et sanguins.

### **CONTAMINATION & TRANSMISSION**

C'est une maladie vectorielle, véhiculée par certains moustiques (phlébotomes).

Transmission par piqûre de moustique.

### **INCUBATION & DEPISTAGE**

Incubation : jusqu'à 6 mois.

Dépistage par analyse sanguine.

### **GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

L'infection ne peut jamais être guérie et devient une infection chronique, qui demande un traitement très long, voire à vie. L'espérance de vie de l'animal atteint est souvent réduite due aux complications chroniques.

Un vaccin est disponible dès 6 mois, renouvelable tous les ans, et qui doit être espacé d'au moins 1 mois avec les autres vaccins. Il n'empêche néanmoins pas l'infection, mais il augmente la résistance immunitaire du chien. Il doit être accompagné d'un protocole antiparasitaire adapté et régulier.

## **LA DIROFILARIOSE** (nématode *Dirofilaria immitis*).

### **SYMPTOMES**

Les vers envahissent le cœur et les symptômes dépendent du degré de l'infestation : mauvais état général, perte d'appétit et de tolérance à l'effort, troubles respiratoires et malaises (en particulier après un effort), épanchement pleural (liquide autour des poumons).

### **CONTAMINATION & TRANSMISSION**

C'est une maladie vectorielle, véhiculée par les moustiques.  
Transmission par piqûre de moustique.

### **INCUBATION & DEPISTAGE**

Un chien infecté peut rester de nombreuses années sans signe clinique, pendant lesquelles les vers se reproduisent à l'intérieur de son organisme.

Dépistage par analyse sanguine et échographie cardiaque.

### **GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT**

C'est une maladie grave, en particulier lorsque l'infestation est importante. Dans les zones à risque, le traitement est avant tout préventif. Chez les chiens infectés, il dépend du degré d'infestation.

Il n'existe pas de vaccin, la meilleure prévention reste un protocole antiparasitaire adapté et régulier.

**LA GIARDIOSE** (protozoaire *Giardia duodenalis*). Zoonose (mais infestation rare chez l'humain).

### SYMPTOMES

Le protozoaire se fixe à la paroi de l'intestin grêle et provoque principalement une diarrhée très caractéristique aqueuse, malodorante, parfois avec du mucus et du sang.

D'autres symptômes incluent une baisse d'appétit, des vomissements, un abattement et une baisse de poids en raison des diarrhées répétées.

### CONTAMINATION & TRANSMISSION

Les kystes sont excrétés dans les selles et sont très résistants dans l'environnement et aux désinfectants.

Contact direct ou indirect (via des surfaces, des vêtements ou du matériel contaminé) avec des selles contaminées.

### INCUBATION & DEPISTAGE

Dépistage par analyse de selles.

### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

C'est une maladie peu grave mais très difficile à éliminer, en particulier s'il y a beaucoup d'animaux dans le même local et à cause de la coriacité des kystes du parasite dans l'environnement. Le traitement inclut une cure antiparasitaire. Il n'existe pas de vaccin et la giardose résiste à la plupart des vermifuges classiques. La meilleure prévention reste une bonne hygiène de l'environnement de l'animal.

**LA GALE SARCOPTIQUE** (acarien *Sarcoptes scabiei var canis*). Zoonose (mais infestation rare chez l'humain).

### SYMPTOMES

Les endroits les plus touchés sont les coudes, le poitrail, les oreilles, le tour des yeux, les membres et le dos.

Démangeaisons intenses (due au parasite creusant des « tunnels » sous la peau du chien), lésions cutanées (perte de poils, croûtes, plaies) dues au grattage.

### INCUBATION & DEPISTAGE

Incubation : 1 à 6 semaines (généralement 3 semaines).

Dépistage par examen clinique et prélèvements cutanés.

### CONTAMINATION & TRANSMISSION

Contact direct avec un animal infecté.

### GRAVITE, PREVENTION & TRAITEMENT

Ce n'est pas une maladie grave, et elle se soigne facilement, mais elle est très inconfortable pour le chien. Les traitements dépendent du degré de l'infestation.

Il n'existe pas de vaccin, la meilleure prévention reste un protocole antiparasitaire adapté et régulier.

## **IV – Les urgences spécifiques au chien : la torsion de l'estomac**

La torsion (ou retournement ou syndrome dilatation-torsion), de l'estomac est une urgence vétérinaire absolue spécifique à la race canine.

Elle se produit lorsque l'estomac se dilate (souvent après une prise de nourriture, de boisson ou d'air trop importantes) et se retourne, bloquant ainsi le flux sanguin vers l'estomac et les intestins et empêchant les gaz gastriques de s'évacuer.

En l'absence d'une intervention rapide, le chien peut décéder en quelques heures seulement. Le seul traitement est une intervention chirurgicale permettant de détordre et de remettre en place l'estomac, qui peut dans certain cas être suturé à la paroi de l'abdomen pour éviter une récurrence (gastropexie).

Bien que toutes les races de chiens puissent être affectées, la maladie concerne surtout les grandes races et les races à thorax profond. Les animaux âgés ou en surpoids sont également plus à risque.

## **LES SYMPTOMES**

- Tentatives de vomissements infructueuses,
- Gonflement de l'abdomen et tympanisme (l'estomac sonne creux),
- Agitation, affaiblissement ou immobilisation totale avec étourdissement (état de choc),
- Salivation excessive
- Refus de nourriture ou de boisson,
- Muqueuses pâles,
- Fréquence cardiaque augmentée.

## **PREVENTION**

- Eviter les repas trop copieux et préférer plusieurs petits repas dans la journée,
- Eviter tout exercice rigoureux après un repas.

## IMAGES

Toute photo ou illustration estampillée **Mi & Moune – ELISA MOUGEY EI** appartient à Mi & Moune EI et est protégée par le droit d'auteur.

La dentition du chien : <https://veterinaire-tournamy-mougins.fr/>

Les défauts de dentition du chien : <https://www.forum-chien.com/>

L'appréciation de l'état d'engraissement du chien : <https://www.mplabo.com/>

Toute autre photo ou illustration est libre de droits.

---

### **POUR EN SAVOIR PLUS** (ces infos ne vous seront pas demandées à l'examen, mais elles peuvent vous intéresser)

Site de l'European Scientific Counsel Companion Animal Parasites (ESCCAP) : <https://www.esccap.fr/>

Schéma du traitement des puces et des tiques chez le chien et le chat de l'ESCCAP :

[https://www.esccap.org/uploads/docs/x2s850js\\_ESCCAP\\_CH\\_SchemaEkto\\_HundKatze\\_f\\_def.pdf](https://www.esccap.org/uploads/docs/x2s850js_ESCCAP_CH_SchemaEkto_HundKatze_f_def.pdf)

Recommandations de l'ESCCAP : [https://www.esccap.org/uploads/docs/kbdi1sem\\_ESCCAP\\_Recommendations\\_French\\_DEF.pdf](https://www.esccap.org/uploads/docs/kbdi1sem_ESCCAP_Recommendations_French_DEF.pdf)

Traitement et prévention des parasitoses des carnivores domestiques ESCCAP : <https://www.esccap.fr/images/guides/guide3/ESCCAP-guide3-ectoparasites-chien-chat.pdf>

Guide de vermifugation individuelle des chiens et des chats ESCCAP : <https://www.esccap.fr/images/guides/guide1/guides-vermifugation-cn-ct-2023-vertF.pdf>

Adapter un tableau de rationnement selon les besoins individuels en relation avec l'état physiologique du chien (SNPCC) :

<https://snpcc.com/wp-content/uploads/2020/04/adapter-un-tableau-de-rationnement-CHIEN.pdf>