



Desafío



@pesoidealconpaula




Test Casero del Bicarbonato

Una prueba sencilla que puedes realizar en casa para evaluar tu producción de ácido gástrico y orientar tu digestión hacia un estado óptimo. Aprende cómo funciona, qué necesitas y cómo interpretar los resultados.



La Reacción de Neutralización

Para entender el test del bicarbonato, primero debemos comprender qué es una **reacción de neutralización**: cuando un ácido y una base se combinan, se produce una sal y agua. Esta es la base química del test.



Ácido

pH < 7. Sustancia con alta concentración de iones H⁺.

Alcalino

pH > 7. Sustancia con baja concentración de iones H⁺.

Neutro

pH = 7. Equilibrio perfecto entre ácidos y bases.

El bicarbonato de sodio es una **base** (pH > 7). Al ingerirlo en ayunas, reacciona con el ácido clorhídrico del estómago produciendo dióxido de carbono (CO₂), que se manifiesta como un eructo. La velocidad con la que aparece ese eructo nos indica el nivel de acidez gástrica.


El Bicarbonato de Sodio

¿Qué es?

El bicarbonato de sodio (NaHCO_3) es una sal mineral de carácter alcalino, ampliamente utilizada en cocina, limpieza y medicina. En este test actúa como agente revelador de la acidez gástrica.

¿Cómo actúa en el estómago?

Al entrar en contacto con el ácido clorhídrico (HCl) del estómago, el bicarbonato reacciona produciendo CO_2 . Este gas genera presión que se libera en forma de eructo. Cuanto más ácido haya en el estómago, más rápida será la reacción y antes aparecerá el eructo.



Advertencias Importantes

 **ESTE TEST ES ORIENTATIVO Y NO SUSTITUYE DIAGNÓSTICO MÉDICO.** Consulta siempre con un profesional de la salud ante cualquier duda o síntoma.

NO realizar esta prueba si:

Úlcera gástrica

Tienes diagnóstico de **úlcera gástrica**.

Gastritis severa activa

Padeces **gastritis severa activa**.

Inhibidores de bomba de protones

Estás tomando **inhibidores de bomba de protones**.

Tratamiento médico digestivo

Estás bajo **tratamiento médico digestivo**.

Recuerda siempre:

Si tienes alguna condición médica preexistente o tomas medicación habitual, consulta con tu médico antes de realizar este test. Los resultados deben interpretarse siempre en el contexto de tu historial clínico completo.

Material Necesario

Antes de comenzar, asegúrate de tener todo preparado la noche anterior para poder realizarlo a primera hora de la mañana, en ayunas.



Bicarbonato de sodio

½ cucharadita de bicarbonato de sodio (aproximadamente 2,5 g).



120 ml de agua tibia

El agua debe estar tibia, no fría ni caliente, para facilitar la disolución del bicarbonato.



Cuchara medidora

Una cucharadita pequeña para medir con precisión la cantidad de bicarbonato.



Cronómetro

Usa el cronómetro de tu móvil para medir con exactitud el tiempo hasta el primer eructo.

Cómo Realizar la Prueba

Sigue estos cinco pasos con precisión para obtener un resultado fiable. Es fundamental realizarlo en ayunas y sin haber bebido nada previamente.

		
Al despertar Ayuna toda la noche, no comas ni bebas nada. Al despertar por la mañana, antes de comer o beber nada, ten listo un vaso de agua tibia con el bicarbonato ya preparado.	Disuelve Disuelve una cucharadita pequeña de bicarbonato de sodio en ese vaso de agua tibia. Remueve bien hasta que se disuelva completamente.	Bebe de un trago Bebe toda la mezcla de una vez. No la sorbas poco a poco; es importante ingerirla de golpe para que la reacción sea uniforme.
		
Mide el tiempo Comienza a medir el tiempo inmediatamente después de beber. Presta atención a cuánto tiempo tardas en eructar por primera vez.	Anota el resultado Registra cuánto tiempo tardas en eructar. Este dato es clave para interpretar tu nivel de acidez gástrica.	

Interpretación de los Resultados

El tiempo que tardas en eructar tras beber la mezcla de bicarbonato revela información clave sobre tu producción de ácido gástrico. Existen tres posibles escenarios:



⚡ Antes de 2 minutos

Posible Hiperclorhidria. Exceso de ácido gástrico. Síntomas asociados: tendencia a diarrea, acidez, reflujo, irritación de mucosa, dolor en ayunas que mejora al comer, sensación de ardor.



✅ Entre 2 y 3 minutos

Producción Normal. Digestión adecuada. Puedes iniciar protocolo de adelgazamiento (como el Desafío LCM) con normalidad si no hay síntomas relevantes.



🐢 Después de 3 min o ausencia

Posible Hipoclorhidria. Baja producción de ácido. Síntomas asociados: estreñimiento, digestión lenta, evacuaciones incompletas, hinchazón, dolor después de comer, sensación de plenitud con poca comida.

¿Por Qué es Importante el Ácido Gástrico?

El estómago debe ser **naturalmente ácido**. El ácido clorhídrico (HCl) es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo. Una producción inadecuada —tanto por exceso como por defecto— puede tener consecuencias importantes para la salud digestiva y general.



Absorción de nutrientes esenciales

El HCl es imprescindible para absorber correctamente la **vitamina B12**, el **hierro**, el **magnesio** y el **zinc**. Sin suficiente acidez, estos nutrientes no se asimilan aunque la dieta sea adecuada.



Digestión de proteínas

El ácido gástrico activa la **pepsina**, enzima responsable de descomponer las proteínas, especialmente las de origen animal. Sin acidez suficiente, las proteínas no se digieren correctamente.



Barrera contra infecciones

El ambiente ácido del estómago actúa como **barrera protectora** frente a bacterias, parásitos y patógenos que ingerimos con los alimentos. Previene infecciones y el sobrecrecimiento bacteriano (SIBO).



Equilibrio de microbiota y vaciamiento gástrico

Un nivel adecuado de acidez favorece el **vaciamiento gástrico correcto** y el **equilibrio de la microbiota intestinal**, previniendo la fermentación excesiva y la hinchazón abdominal.

Corrección Según el Resultado

Una vez conocido tu resultado, puedes aplicar un protocolo de apoyo sencillo y natural para corregir el desequilibrio detectado. Recuerda que estos protocolos son orientativos y complementarios, no sustitutos del tratamiento médico.

🔬 Si hay Hipoclorhidria (baja acidez)



Protocolo de apoyo — Shot digestivo 15 minutos antes de comer:

- Jugo de ½ limón en agua
- O una cucharada de vinagre de manzana en agua

Objetivo: Estimular la producción de ácido gástrico y mejorar la digestión.

🔥 Si hay Hiperclorhidria (exceso de ácido)



Protocolo calmante:

- 🌿 1 tapita de aloe vera 15 minutos antes de comer

Objetivo: Proteger la mucosa y ayudar a neutralizar el exceso de ácido.

✓ Si el resultado es normal

Puedes iniciar con total normalidad:

- Dieta de adelgazamiento
- Reto gratuito
- Protocolo de mejora metabólica

Solo corregir síntomas aislados si existen dentro del programa.

▣ Gracias, mariposas lindas ▣

Gracias por decir sí a este desafío. Gracias por regalarse estos días para escucharse, cuidarse y volver a lo natural.

Cada paso que dan en este reto no es solo por el cuerpo, es por su amor propio, su energía y su salud consciente.

Estoy orgullosa de ustedes.

Recuerden: esto no es una dieta, es una transformación 🐛🦋

Con cariño, La mariposa reina 🌙▣

