

LA MÉTHODE ET LES OUTILS D'ÉVALUATION CLINIQUE

#-Dépistage de la sur efficience intellectuelle ou émotionnelle et étude du fonctionnement psychoaffectif

#-Analyse du fonctionnement intellectuel, cognitif

- Épreuve d'efficience intellectuelle générale : Tests psychotechniques
- Edités par Élisabeth Simonin, Formatrice au CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale
- Test d'intelligence cristallisée et d'intelligence fluide
- Test de mémoire de travail (mémoire à court terme)

#-Analyse de l'intelligence émotionnelle

- Test d'évaluation personnelle de l'intelligence émotionnelle, publié par le psychologue australien Nicolas S. Schutte en 1981, évalue l'intelligence émotionnelle telle que définie par Peter Salovey et John Mayer (1990)
- L'Échelle d'affects positifs et d'affects négatifs ("Positive Affect and Negative Affect Schedule" – PANAS), publiée par le psychologue américain David Watson et ses collègues en 1988. C'est l'un des tests les plus fréquemment utilisés pour mesurer l'affectivité dans la recherche en psychologie.
- L'Échelle de difficultés de régulation des émotions, publié par les psychologues américaines Kim L. Gratz et Lizabeth Roemer, qui évalue les difficultés liées à six composantes de la régulation des émotions.

#-Dépistage Syndrome d'Asperger

- l'Échelle diagnostique de l'autisme et de l'Asperger de Ritvo - révisée (RAADS-R) révisée par la psychiatre suédoise Susanne Bejerot. « Ritvo Autism and Asperger Diagnostic Scale-Revised » : Jonna M Eriksson, Lisa MJ Andersen, Susanne Bejerot (2013), RAADS-14 Screen : validity of a screening tool for autism spectrum disorder in an adult psychiatric population.

#-Dépistage des troubles du spectre de l'autisme TSA

- Le test du Quotient du spectre de l'autisme chez l'adulte, publié par le psychologue britannique Simon Baron-Cohen en 2001. S. Baron-Cohen, S. Wheelwright, R. Skinner, J. Martin and E. Clubley (2001), The Autism Spectrum Quotient (AQ) : Evidence from Asperger Syndrome/High Functioning Autism, Males and Females, Scientists and Mathematicians, Journal of Autism and Developmental Disorders. Traduction française : Stéphanie Braun et Chantal Kempenaers (2007).

#-Dépistage du trouble de déficit d'attention et/ou de l'hyperactivité TDAH

- Le test de l'échelle de TDAH chez l'adulte, développé par le psychiatre américain Ronald Kessler en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) Kessler, R.C. and al. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ADHD-ASRS v1.1) : A Short Screening Scale for Use in the General Population. Psychological Medicine."Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", publié par l'American

Psychiatric Association. Les critères diagnostiques du DSM-5, publié en 2013, sont demeurés les mêmes que ceux du DSM-IV (à l'exception de l'âge de survenue du trouble située avant 12 ans plutôt que 7 ans).

#-Dépistage des maladies dépressives

- Le Test de l'échelle de dépression de Hamilton, publié en 1960 par le psychiatre Max Hamilton et révisé en 1967. C'est l'un des plus utilisés par les professionnels de la santé pour évaluer l'évolution des symptômes lors du traitement (psychothérapie ou médicaments antidépresseurs) de la dépression dite majeure ou caractérisée (autrefois souvent appelée dépression nerveuse). J. L. Hedlund et B. W. Viewig, « The Hamilton rating scale for depression: a comprehensive review », *Journal of Operational Psychiatry*, no 10, 1979, p. 149-165

#-Dépistage du trouble bipolaire

- Le test "Questionnaire de trouble de l'humeur" Publié en 2000 par le psychiatre américain Robert M. Hirschfeld. Il est basé sur les critères diagnostiques du DSM (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux). Deux principaux types de trouble bipolaire sont distingués :
- Le trouble bipolaire I dont la caractéristique essentielle est la survenue d'un épisode de manie (cet épisode peut avoir été précédé ou peut être suivi d'épisodes d'hypomanie ou d'épisodes de dépression majeure)
- Le trouble bipolaire II dont la caractéristique essentielle est la survenue passée ou actuelle d'un épisode d'hypomanie et la survenue actuelle ou passée d'un épisode de dépression majeure. Hirschfeld RM, Williams JB, Spitzer RL, et al. (2000), *Development and validation of a screening instrument for bipolar spectrum disorder : the Mood Disorder Questionnaire*. *American Journal of Psychiatry*. Traduction libre de Psychomédia. DSM-IV et DSM-5 (2013), *Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ("Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders")*, publié par l'American Psychiatric Association.

Veuillez noter que ces tests ne sont pas présentés dans le but de permettre des diagnostics des troubles mentaux, mais simplement à titre de dépistage afin d'obtenir une détection de la douance la plus pertinente possible.