


# Poids-pour-l'âge FILLES

De la naissance à 2 ans (percentiles)



La constatation d'un fléchissement de la courbe de poids ou même le passage sous le 3ème percentile, nécessitent un examen médical et une évaluation soigneuse de la conduite de l'allaitement. La multiplication des tétées, la pratique de la "super-alternance" des seins, la compression des seins durant les tétées, la stimulation avec un tire-lait moderne double pompage peuvent se révéler très efficaces pour stimuler la lactation et permettre la poursuite de l'allaitement. Les aliments solides seront donnés en plus des tétées au début de la diversification, et non en remplacement des tétées, le lait humain ayant une meilleure valeur nutritionnelle.

[www.lllfrance.org](http://www.lllfrance.org)



Normes OMS de croissance de l'enfant

# Poids-pour-l'âge GARÇONS


De la naissance à 2 ans (percentiles)



La Leche League  
FRANCE

La constatation d'un fléchissement de la courbe de poids ou même le passage sous le 3ème percentile, nécessitent un examen médical et une évaluation soignée de la conduite de l'allaitement. La multiplication des tétées, la pratique de la "super-alternance" des seins, la compression des seins durant les tétées, la stimulation avec un tire-lait moderne double pompage peuvent se révéler très efficaces pour stimuler la lactation et permettre la poursuite de l'allaitement. Les aliments solides seront donnés en plus des tétées au début de la diversification, et non en remplacement des tétées, le lait humain ayant une meilleure valeur nutritionnelle.

www.llfFrance.org



Normes OMS de croissance de l'enfant